

Описание лекарственного препарата Мэлсмон основано на официально утвержденной инструкции по применению препарата для специалистов и утверждено компанией-производителем для издания 2011 года. Министерством Здравоохранения и Социального Развития Российской Федерации.



МЭЛСМОН Инструкция по применению лекарственного препарата

Регистрационный номер: ЛП-000550

Торговое название препарата: Мэлсмон

Международное непатентованное название: -

Лекарственная форма: раствор для кожного введения.

Состав

1 ампула содержит:

плаценты человека гидролизат 100 мг.

Вспомогательные вещества: спирт бензиловый 30 мг., натрия гидроксид до pH 6.8-7.0, вода для инъекций до 2 мл.

Описание: прозрачный или с легкой опалесценцией раствор от светло-желтого до желтого с коричневым оттенком цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: противоклимактерическое средство.

Код АТХ: G02CX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Механизм действия препарата точно не установлен. Достоверно установлено, что биологически активные вещества, содержащиеся в гидролизате плаценты человека, повышают активность клеточного и тканевого дыхания, положительно влияют на процессы метаболизма в клетках, обладают антиоксидантным действием и стимулируют регенерацию тканей; снижают утомляемость, активизируют процессы саморегуляции организма, способствуют повышению адаптационных механизмов в перименопаузальной и постменопаузальной периоды.

Фармакокинетика

Препарат быстро всасывается после введения. Поскольку основными компонентами действующего вещества являются аминокислоты, они естественным образом включаются в нормальные метаболические процессы организма и не нуждаются в специальных путях экскреции.

Показания к применению

В составе комплексной терапии, для коррекции астенических состояний у женщин в перименопаузе, характеризующихся снижением внимания, работоспособности, чрезмерной возбудимостью и реактивностью.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к действующему веществу и/или другим компонентам препарата;
- Нарушение функций эндокринных желез;
- Артериальная гипертензия;
- Беременность и период лактации;
- Детский возраст.

С осторожностью

Рекомендуется назначать с осторожностью при почечной и/или печеночной недостаточности; при желчекаменной болезни, прогрессирующих заболеваниях сердечнососудистой систем; при сахарном диабете; ослабленным больным.

Способ применения и дозы

Препарат применяют подкожно, только под наблюдением врача.

Взрослые: в составе комплексной терапии у женщин в перименопаузе вводится по 2 мл. препарата через день (3 ампулы в неделю), в течение двух недель. При необходимости через 1-2 недели курс лечения можно повторить.

Введение препарата производится только путем подкожных инъекций!

Внутривенное введение препарата строго запрещено!

Побочные действия

Аллергические реакции: сыпь, зуд, аллергический дерматит, крапивница, жар, озноб, тошнота.

Местные реакции: болезненность, покраснение, чувство тепла в месте введения препарата.

Другие: боли в области молочной железы.

При появлении данных симптомов следует прекратить введение препарата и обратиться к врачу.

Если Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Особые указания

Женщинам в перименопаузе показан медицинский осмотр в индивидуальном порядке, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

Передозировка

В настоящее время о случаях препарата МЭЛСМОН не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Во избежание возможных лекарственных взаимодействий в препаратом МЭЛСМОН, применять другие препараты можно только после согласования с врачом.

Не взаимодействуют с препаратами, применяемыми в комплексной терапии у женщин в перименопаузе.

Сведения о каких-либо других клинически значимых взаимодействиях МЭЛСМОН до настоящего времени отсутствуют.

Применение препарата МЭЛСМОН при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период вскармливания.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата МЭЛСМОН не влияет на концентрацию внимания и быстроту психомоторных реакций, соответственно, не оказывает влияния на управление транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Раствор для подкожного введения

По 2 мл. в ампулах темного стекла гидролитического класса 2(Eur,Ph), каждая ампула имеет точку надлома. По 50 ампул вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту врача.

Название и адрес производителя

Мэлсмон Фармасьютикал Ко., ЛТД., Офисный центр "Хорикоси билдинг", 3 этаж, 39-бан, 1-го, 2-тэмэ Икэбукуро, Тосима-ку, Токио, 171-0014, Япония